

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa, dari 28 pasien: 15 pasien mendapat kombinasi Antasida, Ranitidin, CTM dan Vitamin. 6 pasien mendapat kombinasi Antasida, Ranitidin, dan Vitamin. 5 pasien mendapat kombinasi Antasida dan ranitidin. Dan 2 pasien mendapat 5 kombinasi yaitu obat Asam mefenamat, Cotrimoxazole, Captopril, Lansoprazole dan HCT.

Pada penelitian ini terdapat pemberian kombinasi obat yang sebenarnya tidak perlu diberikan, yaitu pemberian Asam mefenamat, CTM, Domperidon

1.2. Saran

1. untuk pihak Puskesmas agar dapat memperhatikan gejala atau keluhan yang di derita pasien sebelum memberikan kombinasi obat karena untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pihak puskesmas agar dapat menyarankan kepada penderita untuk mengatur pola makan, menghindari stress, olahraga, mengurangi pemakaian obat golongan OAINS.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian ini untuk bisa melakukan penelitian kerasionalan pemberian obat pada pasien gastritis dan dengan metode penelitian yang berbeda.