

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Kulit ari yang sudah dikupas lebih berpengaruh dibandingkan dengan kulit ari yang belum dikupas pada pertumbuhan benih tanaman kakao. Pengaruhnya dapat dilihat dengan perbandingan tanaman kakao yang memiliki kulit ari dan yang tidak memiliki kulit ari, yaitu:

1. Rataan tinggi benih tanaman kakao yaitu benih memiliki kulit ari adalah 13,27 cm lebih rendah dibandingkan benih tanpa kulit ari adalah 16,60 cm. Rataan lebar daun benih tanaman kakao yaitu benih memiliki kulit ari adalah 3,14 cm lebih rendah dibandingkan benih tanpa kulit ari adalah 3,99 cm.
2. Rataan panjang daun benih tanaman kakao yaitu benih memiliki kulit ari adalah 9,03 cm lebih rendah dibandingkan benih tanpa kulit ari adalah 9,96 cm. Rataan jumlah daun benih tanaman kakao yaitu benih memiliki kulit ari adalah 3,60 helai lebih rendah dibandingkan benih tanpa kulit ari adalah 3,59 helai.

### **5.2 Saran**

Perlu dilakukan kajian lanjut mengenai teknik budidaya tanaman kakao dan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tentang pengaruh kulit ari terhadap pertumbuhan benih tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.) yang nantinya akan diinformasikan kepada petani dan khalayak umum.