

ABSTRAK

Indah C. J. Van Gobel. NIM : 821 310 012 “Gambaran Penggunaan Kombinasi Obat Dexamethason dan Siproheptadin HCl di Apotek X Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo” (Suatu Penelitian di Apotek X Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo). Karya Tulis Ilmiah, Program Studi Diploma III Farmasi, Jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo. Dibimbing oleh Nur Rasdianah, S.Si.,M.Si.,Apt selaku pembimbing I dan Nur Ain Thomas,S.Si.,M.Si.,Apt selaku pembimbing II.

Dampak negatif penggunaan kombinasi obat dexamethason dan siproheptadin HCl dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah (hipertensi), diabetes, penglihatan kabur bahkan katarak, pengeroposan tulang, kerusakan ginjal, paru-paru serta jantung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penggunaan kombinasi obat dexamethason dan siproheptadin HCl di apotek X Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menggunakan tehnik *convenience sampling* dimana sampel yang diambil adalah sampel yang ditemui di lokasi penelitian. Pengambilan sampel ini dilakukan selama 3 minggu dengan cara mencatat setiap pembelian kombinasi obat dexamethason dan siproheptadin HCl.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total pembelian kombinasi obat dexamethason dan siproheptadin HCl yakni sebanyak 52 orang dan sebagian besar pembeli kombinasi obat ini berumur sekitar 15-24 tahun dimana total rata-rata pembeli perhari yaitu sebanyak 3 orang. Pembelian dexamethason dan siproheptadin HCl perhari yakni sebanyak 10 tablet. Pasien yang menggunakan kombinasi obat dexamethason dan siproheptadin HCl dengan tujuan untuk menambah berat badan yaitu sebanyak 50 orang, dimana 38 orang mengatakan bahwa sumber informasi obat ini berasal dari teman. Selain itu, pasien yang tidak peduli terhadap efek samping penggunaan jangka panjang yaitu sebanyak 47 orang.

Kata Kunci : Gambaran Penggunaan, Dexamethason, Siproheptadin.

ABSTRACT

Indah C. J. Van Gobel, Identity Number : 821 310 012 “ Description of Utilization of medicine combination Dexamethasone and Ciproheptadin HCl in X Chimis’s Limboto, Gorontalo District “ (a research in X Chimis’s Limboto, Gorontalo District). Scientific papers, study program Diploma III Departement of Pharmacy, Health Science and Sport Faculty. Gorontalo State University. Guided by Nur Rasdianah, S.Si, M.Si, Apt as 1st supervisor and Nur Ain Thomas, S.Si, M.Si, Apt as 2nd supervisor.

The negative side of using drugs combination of dexamethasone and ciproheptadin HCl in long range causes hypertention, diabetic, sight blur even cataract, osteoporosis, damage kidney, lungs, and heart. The aim of this research are to know the description of utilization of medicine combination dexamethason and ciproheptadin HCl at X chimis’s Limboto, Gorontalo District, using a *convience sampling* method where the sample are the accessible sample in research site. The sampling will execute for 3 weeks by write down every purchasing of medicine combination dexamethason dan ciproheptadin HCl.

The result showed that the total of purchasing medicine combination of dexamethason and ciproheptadin HCl are 52 people and most of the customer are 15-24 years old. Which the consumer day average are 3 people. The purchasing of dexamethason and ciproheptadin HCl are 10 tablets per day. Patient who use medicine combination of dexamethason and ciproheptadin HCl for make more fat are 50 people, which 38 people said that the information source come from their friend. Else, the patient don’t care about the said effect of long range utilize are 47 people.

Key Words : Description of using, Dexamethasone, Ciproheptadin