

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Profil penggunaan antibiotik di Ruang ICU, ICCU, NICU, dan PICU adalah sebagai berikut :

1. Pasien yang menggunakan antibiotik ICU 81,75%, ICCU 39,66%, NICU 83,19 % dan PICU 85,14%.
2. Penggunaan antibiotik terbanyak adalah golongan sefalosporin dengan jumlah ICU sebanyak 75,84%, ICCU 65,88%, NICU 88,46% dan PICU 84,66%.
3. Penggunaan antibiotik di Ruang ICU, ICCU, NICU dan PICU adalah 100% menggunakan merek generik.
4. Bentuk sediaan antibiotik terbanyak adalah injeksi dengan jumlah masing-masing di ruang ICU sebanyak 100%, ICCU 88,24% NICU 75,44%, dan PICU 100% .
5. Penggunaan zat aktif antibiotik terbanyak di ruang ICU dan ICCU adalah Ceftriaxone sebanyak 47,44% dan 49,4%, sedangkan di ruang NICU dan PICU adalah Cefotaxime sebanyak 63,89%, dan 60,32%.

1.2 Saran

1. Untuk RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe

Pemilihan obat generik sebagai pilihan utama terus dipertahankan dan menjadi prioritas utama.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian rekam medik di Rumah Sakit lain, khususnya untuk Ruang Intensif untuk mengetahui apakah di Rumah Sakit tersebut baik dan terkontrol penggunaannya dan apakah lebih mengutamakan obat dengan nama generik atau obat dengan nama dagang.