

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan yaitu :

1. Ditemukan infestasi cacing *paramphistomum sp.* Pada lambung sapi yang berasal dari TPH andalas dan Biau Kota Gorontalo. Pengamatan di lakukan pada bulan juni 2013
2. *Positive rate* infestasi cacing *Paramphistomum sp.* pada lambung sapi yang berasal dari TPH Andalas dan TPH Biau adalah 54 ekor dari 60 sampel yang diperiksa.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap kejadian paramphistomiasis pada sapi ditingkat penjual maupun pada sapi yang dipelihara masyarakat untuk mengetahui epidemiologi penyebaran penyakit ini.
2. Tingginya *positive rate* infestasi cacing paramphistomiasis menggambarkan pola pemeliharaan sapi masih perlu dibenahi.
3. Perlu dilakukan pemberian obat cacing secara periodik 3 bulan sekali dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan telur cacing melalui feses sapi setelah 3 bulan pemberian obat cacing setiap tahunnya.