

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian penggunaan obat gastritis pada pasien rawat inap RSUD Toto Kabila penggunaan obat gastritis sudah sesuai. Dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis obat yang paling banyak digunakan untuk terapi gastritis yaitu ranitidin sebanyak 42 (40 %). Karena ranitidin memiliki efek samping yang sedikit dan ringan dibandingkan obat lainnya, dan juga gastritis langsung bekerja menghambat ikatan antara histamin dan reseptor H₂.
2. Kombinasi obat gastritis yang paling banyak digunakan yaitu ranitidin dan antasida dengan jumlah 32 (60,4%) dengan lama terapi 1-2 hari. Karena kombinasi kedua obat tersebut dapat memberikan efek yang baik dalam penyembuhan gastritis akut dan kronik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah khususnya RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango disarankan untuk menggunakan kombinasi ranitidin dan antasida. Karena kombinasi kedua obat tersebut dapat menghilangkan keluhan dalam waktu 1-2 hari
2. Untuk peneliti lain
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan :
 - a. Kerasionalan penggunaan obat gastritis pada pasien gastritis
 - b. Membandingkan tingkat kesembuhan obat gastritis yang diberikan secara tunggal atau kombinasi
 - c. Kajian penggunaan obat gastritis pada pasien lanjut usia
 - d. Interaksi obat gastritis pada pasien usia lanjut
 - e. Evaluasi penggunaan obat gastritis dengan menggunakan instrumen penelitian kuisioner