

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penambahan vitamin C, terhadap pertumbuhan benih ikan kerapu bebek (*Cromileptes altivelis*) dapat disimpulkan bahwa:

1. Vitamin C dengan dosis 4 gram memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan benih ikan kerapu bebek.
2. Pertumbuhan berat tertinggi ditunjukkan pada perlakuan D berturut-turut sebesar 1,96 cm dan 4,14 g, disusul perlakuan C berturut-turut sebesar 1,87 cm dan 4,12 g, disusul perlakuan B berturut-turut sebesar 1,65 cm dan 4,07 g, dan terendah pada perlakuan A berturut-turut sebesar 1,57 cm dan 3,97 g.
3. Hasil analisis sidik ragam berat benih ikan kerapu bebek menunjukkan bahwa penambahan vitamin C, dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda nyata ($p < 0,05$), dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) diperoleh pada setiap perlakuan berbeda nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diusulkan adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh pemberian pakan yang berbeda dengan penambahan vitamin C untuk peningkatan imun ikan kerapu bebek.