

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

5. 1. 1 Pasien pada kelompok umur 31-35 tahun merupakan pasien dengan jumlah tertinggi yaitu 24 orang (47,1%). Untuk tingkat pendidikan pasien dengan pendidikan terakhir SMA merupakan pasien terbanyak yaitu 15 orang (29,4%). Sedangkan pada kelompok pekerjaan pasien terbanyak rata-rata adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan jumlah 16 orang (31,4%).
5. 1. 2 Kejadian plasenta previa sebesar 37 orang (72,5%) dimana plasenta previa dengan multipara sebanyak 17 orang dan primipara sebanyak 20 orang (58,8%). Adapun untuk perdarahan antepartum yang bukan disebabkan plasenta previa sebanyak 14 orang (41,2%) yang terdistribusi pada primipara. Hal ini menunjukkan kejadian plasenta previa meningkat pada multipara.
5. 1. 3 Terdapat hubungan antara paritas dengan perdarahan antepartum yang disebabkan plasenta previa di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Aloi Saboe Kota Gorontalo tahun 2014, dimana hasil uji statistik Chi Square diperoleh X^2 hitung > X^2 tabel (9,649 > 3,841) dengan nilai $p = 0,002$ ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

5.2 Saran

5. 1. 4 Bagi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan untuk ibu-ibu Perlu meningkatkan pengetahuan mengenai kejadian plasenta previa pada multiparitas sehingga bisa mewaspadaai kemungkinan terjadinya plasenta previa serta pentingnya Ante Natal Care secara rutin.

5. 1. 5 Bagi instansi pemerintah

Melalui instansi pemerintah agar lebih menekankan pada tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan asuhan bagi ibu hamil, melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan USG pada usia kehamilan lebih dari 28 minggu pada ibu hamil dengan faktor risiko tersebut, memberi upaya preventif terhadap faktor-faktor risiko terjadinya plasenta previa seperti penyuluhan terhadap program KB.

5. 1. 6 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya dengan menambah jumlah variabel penelitian yaitu faktor-faktor lain yang berhubungan dengan plasenta previa, seperti keadaan endometrium, usia ibu, dan penyakit yang menyertai kehamilan, misal hipertensi, mioma uteri, tumor, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang baik dimasa mendatang.