

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi tingkat kepatuhan minum obat pasien penderita HIV/AIDS di RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa pasien yang patuh sebanyak 22 orang (88%) dan pasien tidak patuh 3 orang (12%), dengan kepatuhan > 80% maka kepatuhan minum obat pasien penderita HIV/AIDS di RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe tahun termasuk dalam kategori kepatuhan baik.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu meningkatkan lagi kepatuhan minum obat pasien HIV/AIDS agar tidak terjadi kegagalan pengobatan terutama resistensi obat di masa akan datang.
2. Faktor dukungan keluarga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan minum obat, sehingga pada pasien dengan HIV/AIDS yang statusnya belum diketahui oleh keluarga, perlu di motivasi untuk membuka diri dengan keluarga terdekat
3. Mendorong kebijakan daerah untuk melakukan normalisasi HIV/AIDS dengan cara melakukan sosial promosi tentang dukungan ODHA dan perilaku hidup sehat.
4. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya tentang kepatuhan minum obat pasien HIV/AIDS ini di rumah sakit lain atau dengan variabel-variabel yang berbeda dengan penelitian ini