

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Kadar protein yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada pagi hari memiliki kadar protein lebih tinggi yaitu 4,81% di bandingkan pada yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada sore hari yaitu 4,65%.
2. Total Asam yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada pagi hari total asam lebih tinggi yaitu 0,61% di bandingkan pada yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada sore hari yaitu 0,60%.
3. Mikroba yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada pagi hari mikroba lebih tinggi di bandingkan pada yoghurt susu kambing peranakan etawa yang diperah pada sore hari.

1.2 Saran

Berdasarkan data pengamatan bahwa kadar protein yang diperah pada pagi hari yang baik, sehingga disarankan jika membuat yoghurt susu kambing jangan dihomogenkan antara susu kambing yang diperah pagi dan susu yang di perah sore. Karena kadar protein antara susu kambing yang di perah pada pagi dan sore hari memiliki kadar protein berbeda.