

## ABSTRAK

**Rillya Paputungan. 2015.** *Hubungan lama menjalani hemodialisa dengan stres pada pasien gagal ginjal kronik di ruang hemodialisa RSUD Prof. DR. Aloe Saboe Kota Gorontalo.* Skripsi, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes** dan Pembimbing II **Ns. Vik Salamanja, S.Kep, M.Kes**

Gagal ginjal kronik masih masalah besar didunia. Untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan berbagai terapi, salah satunya dengan terapi hemodialisa. Lama menjalani hemodialisa tersebut akan berdampak terhadap keadaan psikologis pasien. Pasien akan mengalami gangguan proses berpikir dan konsentrasi serta gangguan dalam berhubungan sosial. sehingga menyebabkan menurunnya pola pikir pasien seperti stres. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan lama menjalani hemodialisa dengan stres pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo .

Desain penelitian menggunakan *Cross Sectional study*. Populasi berjumlah 30 responden yang merupakan pasien gagal ginjal kronik. Sampel berjumlah 30 responden dengan teknik *total sampling*. Teknik analisis dengan *uji fisher*.

Hasil penelitian sebagian besar lama menjalani hemodialisa, kurang dari 2 tahun dari 30 responden, pasien yang mengalami stres sedang persentasinya 60% dari 30 responden di RSUD Prof. DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo. Hasil uji statistik didapatkan signifikansi 0,04 Yang berarti ada hubungan bermakna.

Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan lama menjalani hemodialisa dengan stres pada pasien gagal ginjal kronik di RSUD Prof DR. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo dengan nilai 0,04. Perawat hendaknya dalam melaksanakan asuhan keperawatan perlu melihat dan mempertimbangkan faktor karakteristik pasien, selama menjalani hemodialisa

**Kata Kunci: Hemodialisa, Stress, Gagal ginjal kronik**

Daftar pustaka : 34 Referensi (2001-2015)

## ABSTRACT

**Rillya Paputungan.** 2015. A Long Period of Hemodialysis Undergo with Stress in Patients with Chronicle Kidney Failure at Hemodialysis Room in Prof. DR. Aloe Saboe Hospital in Gorontalo City. Skripsi. Study Program Nursing Science, Faculty of Health Sciences and Sports, Universitas Negeri Gorontalo. Supervisor; **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes,** and Co-Supervisor; **Ns. Vik Salamanja, S.Kep., M.Kes.**

Chronicle Kidney failure is one of the biggest problem in the world, to overcome the problem can carry out with various therapy, one of them is hemodialysis therapy. The period of the therapy influence to the psychological of the patient. The patient will experience the impaired thinking process and concentration of social relationship. It caused the decreasing the mindset of patient, like stress. The aim of this research is to know the period on experience the hemodialysis therapy with the stress on Chronicle Kidney failure in Prof. DR. Aloe Saboe Hospital in Gorontalo City.

The design of this research used Cross Sectional Study, the population about 30 respondents as the patient of Chronicle Kidney failure, and 30 patients as the sample and use the total sampling technique. Technique of analyzing the data used fisher test.

The result of the research is most of patients undergo the Hemodialysis, less than 2 years from 30 respondent, the patient experience medium stress about 60% from 30 respondent in Prof. DR. H. Aloe Saboe Hospital. The statistic test has significant 0.04. it means there is a significant relationship.

It can be concluded that there was a relationship between the length of time spent in hemodialisa and the stress experienced by the patient of chronical kidneys failure in RSUD Prof. DR. H. Aloe Saboe of Gorontalo City wiht the value of 0.04. It was recommended that the nurses in implementing the nursing care should look and consider the characteristics of the patient during the hemodialisa time.

**Keywords: Hemodialisa, Stress, Chronical Kidney Failure**

**References: 34 References (2001:2015).**



LEAD YOUR FUTURE