

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK PERSEPSI SENSORI
TERHADAP KEMAMPUAN MENGONTROL HALUSINASI
PENDENGARAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA
DI PUSKESMAS TAPA KABUPATEN
BONE BOLANGO**


Oleh

KARMILA MERTOSONO

NIM : 841415130

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I



dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes
NIP. 19740106 200604 2 001

Pembimbing II



Ns. Ika Wulansari, M.Kep, Sp, Mat

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



dr. Nanang R. Paramata, M. Kes
NIP. 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK TERHADAP
KEMAMPUAN MENGONTROL HALUSINASI PENDENGARAN
PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI PUSKESMAS TAPA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh

KARMILA MERTOSONO

NIM.841 415 130

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari / Tanggal : Jumat , 09 Desember 2016

Waktu : 13.00-14.00 WITA

Tim Penguji

1. **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes** (.....)
NIP. 19740106 200604 2 001
2. **Ns. Ika Wulansari, M.Kep., Sp.Mat** (.....)
3. **dr. Siti Rahma, M.Kes** (.....)
NIP. 19820328 200901 2 005
4. **Ns. Rhein R. Djunaid, S.Kep. M.Kes** (.....)
NIP. 19750112 199403 1 003

Gorontalo, Desember 2016
Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan
Universitas Negeri Gorontalo



Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes
NIP. 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Karmila Mertosono. 2016. *Pengaruh terapi aktivitas kelompok persepsi sensori terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia di Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango*. Skripsi, Jurusan Keperawatan, Fakultas olah raga dan kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes** dan pembimbing II **Ika Wulansari, S.Kep, Ns, Sp.Mat**.

Jumlah penderita Skizofrenia di Indonesia adalah 3-5/1000 penduduk mayoritas penderita berada di kota besar initerkait dengan tingginya stress yang muncul di daerah perkotaan. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh terapi aktivitas kelompok persepsi sensori terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia.

Jenis penelitian quasi eksperimental dengan rancangan one group pre and posttest desain. Total sampling adalah pasien skizofrenia dengan halusinasi yang berobat di puskesmas Tapa sebanyak 12 orang. Data dikumpul menggunakan kuisioner dan dianalisis dengan uji *Wilcoxon Sign Test*.

Hasil analisis menunjukkan terapi aktivitas kelompok persepsi sensoris sebelum dilakukan TAK 12 orang kurang mampu (100%), sesudah dilakukan TAK mampu 10 orang (83,3%), dan kurang mampu 2 orang (16,7%) dengan nilai p value 0,002 ($\alpha < 0,05$).

Disarankan kepada perawat agar mampu menerapkan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) persepsi sensori untuk meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasi pasien skizofrenia dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang cara penanganan pada pasien skizofrenia. Dapat disimpulkan bahwa Terapi aktivitas kelompok persepsi sensoris berpengaruh terhadap kemampuan mengontrol halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia di Puskesmas Tapa Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci : TAK, Halusinasi pendengaran, skizofrenia

Daftar pustaka : 21 referensi (2002-2014)

ABSTRACT

Karmila Mertosono. 2016. The Influence of Sensory Perception Group Activity Therapy towards Ability of Controlling Hearing Hallucination of Schizophrenia Patients at Puskesmas of Tapa, Bone Bolango District. Skripsi, Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes and Co-supervisor is Ika Wulansari, S.Kep, Ns, Sp.Mat.

Number of schizophrenia patients in Indonesia is 3-5/1000 population in which mostly in big cities is caused by high level of stress occurred in urban area. This research aims at analyzing the influence of sensory perception group activity therapy towards ability of controlling hearing hallucination of schizophrenia patients.

It applies quasi experimental research with one group pre and posttest design. Samples are 12 patients of schizophrenia with hallucination who get treatment in Puskesmas of Tapa. Data are collected using questionnaire and analyzed using Wilcoxon Sign Test.

Research findings reveal that there are 12 patients categorized as not able (100%) before group activity therapy is conducted. After it is conducted, patients who are categorized as able are 10 (83,3%) and those who are not able are 2 (16,7%) with p value is 0,002 ($\alpha < 0,05$).

Nurses are suggested to be able to conduct group activity therapy of sensory perception in order to increase ability of controlling hearing hallucination and to increase skill and knowledge of ways of handling schizophrenia patients. It can be concluded that sensory perception group activity therapy influences ability of controlling hearing hallucination of schizophrenia patients.

Keywords: Group Activity Therapy, Hearing Hallucination, Schizophrenia

Bibliography : 21 references (2002-2014)

