

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**HUBUNGAN FAKTOR INDIVIDU DAN PERGAULAN SOSIAL DENGAN
KEBIASAAN MEROKOK PADA MAHASISWA FAKULTAS
OLAHRAGA DAN KESEHATAN TAHUN 2017**


OLEH :

**NILISRIANGGI
811413047**

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diuji


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Hj. Lintje Boekoesoe., M.Kes
NIP. 19590110198603 2 003


Sirajuddin Bialangi, S.KM., M.Kes
NIP. 19741117200312 1 003

Gorontalo, 26 Juli 2017
Mengetahui,
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat


Dr. Sunarto Kadir, Drs., M.Kes
NIP: 19660918 199203 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

HUBUNGAN FAKTOR INDIVIDU DAN PERGAULAN SOSIAL DENGAN
KEBIASAAN MEROKOK PADA MAHASISWA FAKULTAS
OLAHRAGA DAN KESEHATAN TAHUN 2017

OLEH

NILISRIANGGI
NIM. 811413047

Telah dipertahankan di depan penguji
Hari/ Tanggal : Sabtu, 29 Juli 2017
Waktu : 08.00-09.00 Wita
Penguji :

1. Dr. Hj. Lintje Boekoesoe., M.Kes
NIP.19590110198603 2 003
2. Sirajuddin Bialangi., S.KM.,M.Kes
NIP. 19741117200312 1 003
3. Dra. Rany Hiola., M.Kes
NIP. 19530913198302 2 001
4. Ramly Abudi, S.Psi., M.Kes
NIP. 19720911200812 1 002

: 
: 
: 
: 

Gerontolo, 29 Juli 2017
Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan




Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes
NIP. 19590110198603 2 003

ABSTRAK

Nilisrianggi. 2017. Hubungan faktor individu dan pergaulan sosial dengan kebiasaan merokok mahasiswa fakultas olahraga dan kesehatan (FOK) Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes dan pembimbing II Sirajuddin Bialangi, S.KM, M.Kes.

Rokok merupakan hasil olahan tembakau yang terdapat tiga bahan utama rokok yaitu nikotin, tar dan karbon monoksida yang dibakar dan dapat mengeluarkan asap ketika dihembuskan oleh pengguna rokok. Rokok sudah menjadi kebiasaan sehari-hari oleh banyak kalangan dari yang tua sampai pada yang muda, semakin banyaknya tempat-tempat umum. Faktor yang mempengaruhi perilaku merokok faktor dari dalam merupakan faktor-faktor yang muncul dari dalam individu dan Lingkungan sosial berpengaruh dalam membentuk sikap, keyakinan (belief) dan intensitas merokok. Remaja memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk merokok jika teman-teman mereka merokok.

penelitian ini merupakan jenis penelitian survey analitik dengan rancangan *cross sectional study* dengan teknik pengambilan sampel yaitu *proportionate stratified random sampling* adapun sampel yang diambil adalah mahasiswa fakultas olahraga dan kesehatan dengan jumlah responden 230 terdiri dari mahasiswa angkatan 2013 dan 2014 jurusan kesehatan masyarakat, farmasi,keperawatan,pedidikan jasmani dan pendidikan kepelatihan olahraga. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square* dengan menggunakan $\alpha = 0,05$ dan 95% tingkat kepercayaan.

Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara faktor individu dengan kebiasaan merokok sebab diperoleh nilai *Chi Square* hitung adalah sebesar 43,533 dengan nilai *sig (2-sided)* sebesar 0,000 dan terdapat hubungan antara pergaulan sosial dengan kebiasaan merokok dengan nilai *Chi Square* hitung adalah sebesar 174,258 dengan nilai *sig (2-sided)* sebesar 0,000.

Kata kunci : Kebiasaan Merokok, Faktor Individu, Pergaulan Sosial.

ABSTRACT

Nilisrianggi. 2017. The Correlation between Individual Factors and Social Interaction with Smoking Habit of Students in Faculty of Sport and Health, State University of Gorontalo. Principal supervisor is Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes and Co-supervisor is Siradjudden Bialangi, S.KM, M.Kes.

Cigarette is a result of tobacco processing. There are three main substances of cigarette, nicotine, tar, and monoxide carbon which can be burned and can produce smoke when exhaling. Smoking has become daily activity by many people from elderly to young people and it has been done in many public places. Factors influencing smoking habit are internal factors that consist of factors from inner self of individual, and social environment factors which also influence in shaping the attitude, belief, and smoking intensity. Young people tend to smoke if their friends are smoking.

This is an analytical survey with cross sectional study design. Technique of sampling is proportionate stratified random sampling. Samples are 230 students of department of public health, pharmacy, nursing, physical education, and sport exercise education, faculty of sport and health, batch of 2013 and 2014. Data analysis applies Chi-Square test using $\alpha = 0,05$ and level of significance at 95%.

Finding reveals that there is correlation between individual factors with smoking habit verified by Chi Square _{count} value for 43,533 and sig (2-sided) value for 0,000, and there is correlation between social interaction with smoking habit verified by Chi Square _{count} value for 174,258 and sig (2-sided) value for 0,000.

Keywords: Smoking Habit, Individual Factors, Social Interaction

