

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT
KECACATAN PADA PENDERITA KUSTA DI KOTA GORONTALO**

OLEH:

**JURNIATI SUBAEDA
811413075**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji

PEMBIMBING I


Dr. Hj. Rama Hiola, Dra, M.Kes
NIP:19540324 198103 2 001

PEMBIMBING II


Ekawati Prasctya, S. Si, M.Kes
NIP:19810227 200812 2 2001

Gorontalo ,19 Desember 2017

**Mengetahui
Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat**


Dr. Sunarto Kadir, Drs., M. Kes
NIP: 19660918 199203 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

FAKTOR RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT
KECACATAN PADA PENDERITA KUSTA
DI KOTA GORONTALO

OLEH

JURNIATI SUBAEDA
NIM. 811413075

Telah dipertaruhkan di depan penguji
Hari/Tanggal : 19 Desember 2017
Waktu : 07.30-08.30 Wita

Penguji :

1. Dr. Hj. Rama P.Hiola, Dra., M.Kes :
NIP. 19540324 198103 2 001
2. Ekawaty Prasetya, S.Si., M.Kes :
NIP. 19810227 200812 2 001
3. Dr. Sunarto Kadir Drs., M.Kes :
NIP. 19660918 199203 1 002
4. Lia Amalia, S. KM., M.Kes :
NIP. 19791129200501 2 017

Gorontalo, 19 Desember 2017
Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan



DEKAN
Dr. H. Lintie Boekoesoe, M.Kes
NIP. 19590110 198603 2 003

ABSTRAK

Jurniati Subaeda. 811413075.2017. Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Tingkat Kecacatan pada Penderita Kusta di Kota Gorontalo, Skripsi, Pembimbing I Dr. Hj. Rama Hiola, Dra, M. Kes dan Pembimbing II Ekawaty Prasetya, S.Si, M.Kes. Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo.

Lepra atau kusta atau lepra (*leprosy*) atau disebut juga Morbus Hansen adalah suatu infeksi kronik yang merusak terutama jaringan syaraf dan kulit. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Faktor Risiko apasajakah yang Berhubungan dengan Tingkat Kecacatan Pada Penderita Kusta di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan tingkat kecacatan pada penderita kusta di Kota Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian *observasional analitik*. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi melalui pemberian kuisioner pada populasi penderita kusta dengan pendekatan *cross sectional*. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita kusta yang ada di Kota Gorontalo yaitu sebanyak 40 orang dengan sampel yang didapatkan sebanyak 26 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan dari hasil uji *chi square* kemudian dilakukan uji lanjutan yakni uji *fisher exact test* dan *rank spearman*. Dengan variabel jenis kelamin (0,529%), tingkat pendidikan (0,540%), tingkat pengetahuan (0,540%), serta status gizi (0,651%) tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan tingkat kecacatan kusta di Kota Gorontalo. Sedangkan variabel keteraturan berobat (0,013%) memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kecacatan kusta di Kota Gorontalo.

Disarankan kepada penderita maupun keluarga yang bersangkutan, agar kiranya lebih menjaga kebersihan diri dan juga lebih memperhatikan lagi kondisi tubuh. Agar supayatidak mudah terpapar oleh penyakit menular lebih khususnya pada penyakit kusta.

Kata kunci : Faktor risiko, tingkat kecacatan, kusta

ABSTRACT

Subacda, Jurniati. 811413075. 2017. The Risk Factors Related to the Level of Disability of Leprosy Patients in Gorontalo City. Undergraduate Thesis. Principal Supervisor: Dr. Hj. Rama Hiola, Dra, M. Kes. Co-Supervisor: Ekawaty Prasetya, S.Si, M. Kes. Department of Public Health, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo

Leprosy or *Morbus Hansen* is a chronic infection that damages the nerve and skin tissue. The problem statement of this research is "what are the risk factors related to the level of disability of Leprosy patients in Gorontalo City?". This research is aimed at determining the issue in the site area.

Analytical observational design was employed in this research. This research was conducted by distributing the questionnaires to the Leprosy patients by using cross-sectional approach. There were 40 populations of Leprosy patients in Gorontalo city involved in this research by which 26 samples are obtained by purposive sampling technique.

From *chi-square*, *Fisher exact* and *rank spearman* tests, it is revealed that the variables of gender (0.529%), education level (0.540%), knowledge level (0.540%) and nutritional status (0.651%) have not significantly related to the disability level of Leprosy in Gorontalo City. However, the variable of treatment regularity (0.013%) does have a significant relationship with the disability level of Leprosy in Gorontalo City.

For that reason, it is suggested for the patients and their families to concern with their personal hygiene and also pay more attention to their body condition. This is to improve the immunity to contagious diseases, especially to leprosy.

Keywords: risk factors, disability level and leprosy

