

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wanita Usia Subur Dalam
Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan
Metode *Pap Smear* Di Kota Gorontalo

Skripsi

Oleh

Sri Endang Widyastuti Pratama

NIM: 841414005


Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I



dr. Sitti Rahma, M.Kes
NIP. 19820328 20091 2 005


Pembimbing II



Ridha Hafid, S.ST., M.Kes
NIP. 19710307 200012 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



dr. Nanang Roswita Paramata, M.Kes
NIP: 19771028 200812 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wanita Usia
Subur Dalam Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks
Menggunakan Metode *Pap Smear* Di Kota Gorontalo

Oleh Sri Endang Widyastuti Pratama

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Juli 2018

Waktu : 13.00 WITA

Penguji

1. dr. Sitti Rahma, M.Kes
NIP: 19820328 20091 2 005
2. Ridha Hafid, S.ST., M.Kes
NIP: 19710307 200012 2 001
3. Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes
NIP: 19590110198603 2 003
4. Ns. Ika Wulansari, S.Kep., M.Kep., Sp.Mat
NIDN: 8814330017

1.


2.

3.

4.

Gorontalo, 17 Juli 2018

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan


Dr. Hj. Lintje Boekoesoe, M.Kes
NIP: 19590110198603 2 003

ABSTRAK

Sri Endang Widyastuti Pratama. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wanita Usia Subur dalam Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks Menggunakan Metode Pap Smear di Kota Gorontalo.* Skripsi, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. **Pembimbing I dr. Sitti Rahma, M.Kes., Pembimbing II Ridha Hafid, S.ST., M.Kes.**

Cakupan skrining kanker serviks yang masih rendah pada WUS, dapat disebabkan karena beberapa faktor. Diantaranya adalah: pengetahuan, keterjangkauan biaya, dan dukungan suami/keluarga. Dari observasi awal melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada wanita usia subur, mereka belum pernah melakukan pemeriksaan *pap smear*, dikarenakan kurang begitu mengetahui tentang *pap smear*. Penelitian ini adalah penelitian survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah wanita usia subur yang berdomisili di Kota Gorontalo. Sampel berjumlah 220 orang yang didapatkan melalui *purposive sampling*. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji *chi square* dengan $\alpha = 0,1$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 189 responden (85,9%) tidak melaksanakan *pap smear*, dengan pengetahuan baik sebanyak 182 responden (85,4%), dukungan suami/keluarga buruk sejumlah 116 responden (95,9%), dan keterjangkauan biaya yang tidak mampu sebanyak 119 responden (99,2%). Tidak terdapat pengaruh faktor pengetahuan ($p = 0,276$), terdapat pengaruh faktor dukungan suami/keluarga ($p = 0,000$), terdapat pengaruh faktor keterjangkauan biaya ($p = 0,000$), terhadap perilaku wanita usia subur dalam melakukan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode *pap smear* di Kota Gorontalo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku pemeriksaan *pap smear*.

Kata Kunci : *Pap Smear, Wanita Usia Subur, Kanker Serviks*
Daftar Pustaka : 33 (2008-2017)

ABSTRACT

Pratama, Sri Endang Widyastuti. 2018. *"Factors Contributing Behavior of Women of Childbearing Age in Conducting Early Detection of Cervix Cancer by Pap Smear Method in Gorontalo City"*. Undergraduate Thesis. Department of Public Health, Faculty of Sports and Health, Universitas Negeri Gorontalo. **Principal Supervisor: dr. Sitti Rahma, M.Kes., Co-supervisor: Ridha Hafid, S.ST., M.Kes.**

The low screening scope of cervix cancer in women of childbearing age is down to several factors: the women's knowledge, cost reachability, and support from husband/family. The preliminary observation and interview depict that women of childbearing age never conduct *Pap Smear* checkup yet due to lack of knowledge about the treatment. The analytical survey study employed a cross-sectional approach. 220 women were selected as research sample by purposive sampling technique from the population of all women of childbearing age. The data were analyzed by the chi-square test with $\alpha = 0.1$.

The result indicates that 189 respondents (85,9%) have never conducted *Pap Smear* treatment; meanwhile, there are 182 respondents (85,4%) who have adequate knowledge of *Pap Smear*. Moreover, lack of support from husband/family is experienced by 116 respondents (95,9%), and 119 (99.2%) respondents cannot afford the treatment cost. Further, only factors of support from husband/family and cost reachability that contribute to the behavior of women of childbearing age in performing early detection of cervix cancer by *Pap Smear* (with $p = 0.000$ each), while knowledge factor does not contribute ($p = 0.276$). The research is expected to be the theoretical background for further researches analyzing other factors contributing behavior of *Pap Smear* detection.

Keywords: *Pap Smear*, Women of childbearing age, Cervix cancer
References: 33 (2008-2017)

