

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :

Hubungan Antara Tingkat Kemandirian Dengan Risiko Dekubitus Pada Pasien Stroke Tirah Baring di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo

Oleh

**FADLIN RIMPANSA**  
NIM. 841 417 095

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji

Pembimbing I



Dr.dr.Muhamad Isman Jusuf,S.Ked.,Sp.S  
NIP. 197807032006041003


Pembimbing II



Ita Sulistiani Basir, S.Kep,Ns.M.Kep  
NIP. 198805292020122009

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan



Ns. Yuniar M. Soeli, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.,J  
NIP.19850621 200812 2 003

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Hubungan Antara Tingkat kemandirian Dengan Risiko Dekubitus pada Pasien Stroke Tirah Baring di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo

Oleh

**FADLIN RIMPANSA**  
**NIM. 841 417 095**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Juni 2021

Waktu : 13.00 Wita

Penguji:

1. **Dr.dr.Muhamad Isman Jusuf,S.Ked.,Sp.S** 1. ....  
NIP. 197807032006041003
2. **Ita Sulistiani Basir, S.Kep.Ns.M.Kep** 2. ....  
NIP. 198805292020122009
3. **dr. Zuhriana K. Yusuf, M.Kes** 3. ....  
NIP. 197401062006042001
4. **Nirwanto K. Rahim, S.Kep.Ns.M.Kep** 4. ....

Gorontalo, 18 Juni 2021

Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan

  
**Prof. Dr. H. Herlina Jusuf, Dra., M.Kes**  
NIP.196310011988032002

## ABSTRAK

**Fadlin Rimpansa. 2021.** *Hubungan Antara Tingkat Kemandirian Dengan Risiko Dekubitus Pada Pasien Stroke Tirah Baring Di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.aloei Saboe Kota Gorontalo.* Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. **Pembimbing I Dr. dr. H. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S, Pembimbing II Ita Sulistiani Basir, S.Kep.,Ns.,M.Kep**

Akibat yang sering terjadi dari adanya penyakit stroke tersebut menyebabkan penderita menjadi keterbatasan fisik, kecacatan dan kelemahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam melakukan perawatan diri, menyebabkan kemandirian pasien terganggu sehingga pasien akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Semakin lamanya hari perawatan, penderita juga akan mengalami tirah baring yang lama sehingga mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya luka dekubitus. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara tingkat kemandirian dengan risiko dekubitus pada pasien stroke tirah baring.

Desain penelitian survey analitik, metode *cross sectional* dengan 35 sampel di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo. Analisis data menggunakan uji *Chi square*.

Hasil penelitian menunjukkan 57,1% responden memiliki tingkat ketergantungan dengan risiko tinggi dekubitus sebanyak 60,0%. Hasil uji statistik tingkat kemandirian dengan risiko dekubitus diperoleh  $p\text{-value} = 0,036 (<\alpha 5\%)$ . Dapat disimpulkan ada hubungan antara tingkat kemandirian dengan risiko dekubitus pada pasien stroke tirah baring di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan perawatan kepada pasien stroke.

**Kata kunci :Risiko dekubitus, stroke, tingkat kemandirian**

## ABSTRACT

**Fadlin Rimpansa, 2021.** *The Relationship Between the Independence Level and the Bedsores Risk in Stroke Patients at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Hospital.* Undergraduate Thesis, Bachelor's Degree Program in Nursing, Department of Nursing, Faculty of Sports and Health, State University of Gorontalo. **The principal supervisor is Dr. dr. H. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S., and the co-supervisor is Ita Sulistiani Basir, S.Kep., Ns., M.Kep.**

The frequent consequences occurred in patients who suffer from stroke are physical limitations, disabilities, and weaknesses in living daily life. One of them is the inability to carry out self-care, which resulted in a decrease in the patient's independence, causing the patient to depend more on others. The longer the day of treatment, the longer the patients' bedrest will be. Thus, the patients have a high risk of developing bedsores. This research aimed to determine the relationship between the independence level with the bed sore risk in bedrest stroke patients. The design of this research used an analytic survey and a cross-sectional method with 35 samples at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Hospital. Data analysis was conducted using the chi-square test.

The results showed that 57.1% of respondents had a dependency level with a high risk of bedsores of 60.0%. The results of the statistical test of the independence level with the bedsores risk obtained the p-value = 0.036 (< a 5%). It can be concluded that there was a relationship between the independence level and the bedsores risk in bedrest stroke patients at Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Hospital. This research is expected to become input in improving care for stroke patients.

**Keywords: Bedsores Risk, Stroke, Independence Level**  
**References: 22 (2013-2021)**

